

# SILKA Miconazole Powder

<b>Drug Facts</b>	
<b>Active ingredient</b>	<b>Purpose</b>
Miconazole nitrate (2%).....	Antifungal
<b>Use</b> for the cure of most athlete's foot	
<b>Warnings</b>	
<b>For external use only</b>	
<b>Do not use</b> on children under 2 years of age unless directed by a doctor	
<b>When using this product</b> avoid contact with eyes	
<b>Stop use and ask a doctor if</b> irritation occurs or there is no improvement within 4 weeks	
<b>Keep out of reach of children.</b> If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center right away.	
<b>Directions</b>	
• Clean the affected area and dry thoroughly • Apply a thin layer of the product over the affected area twice daily (morning and night) or as directed by a doctor. • Supervise children in the use of this product. • Pay special attention to space between the toes; wear well-fitting, ventilated shoes and change shoes and socks at least once daily. • Use daily for 4 weeks. • If condition persists longer, consult a doctor. • This product is not effective on the scalp or nails.	
<b>Other information</b> this product settles during shipment. Package contains full net weight.	
<b>Inactive ingredients</b> Aldioxa, Cellulose, Chloroxylenol, Fragrance, Imidazolidinyl Urea, Talc	
<b>Questions or comments?</b> 1-866-483-2846	

\*This product is not manufactured or distributed by Stiefel Laboratories, Inc., owner of the registered trademarks Zeasorb® and Stiefel®.

Distributed by/Distribuido por:  
Genomma Lab USA, Inc.,  
Houston, TX 77027

For Spanish information



6 50066 00099 7

<b>Información del Medicamento</b>	<b>Purpose</b>
Ingrediente activo	Nitrato de miconazol (2%).....Antifúngico
<b>Uso</b> Cura la mayoría de las infecciones del pie de atleta	
<b>Advertencias</b>	
<b>Para uso externo únicamente</b>	
No lo utilice en niños menores de 2 años a menos que lo indique un médico	
Cuando usando producto evite contacto con los ojos	
Suspenda su uso y consulte a su médico si se produce irritación o no hay mejoría en un plazo de 4 semanas	
Manténgase fuera del alcance de los niños.	
Si se traga, buscar ayuda médica o comunicarse con un centro de toxicología de inmediato	
<b>Indicaciones</b>	
• Limpiar la zona afectada y secar bien • Aplicar una capa delgada sobre la zona afectada dos veces al día (por la mañana y por la noche) o según lo indicado por un médico. • Supervisar a los niños cuando se use este producto. • Prestar especial atención a los espacios entre los dedos del pie; usar calzado ventilado adecuado y cambiar el calzado y los calcetines al menos una vez al día. • Utilice diario durante 4 semanas. • Si la afección persiste, consultar a un médico. • Este producto no es eficaz en el cuero cabelludo ni en las uñas.	
<b>Información adicional</b> El producto puede asentarse durante el envío; el envase contiene el peso neto total.	
<b>Ingredientes Inactivos</b> Aldioxa, Celulosa, Cloroxilenol, Fragancia, Imidazolidinil Urea, Talco	
<b>¿Preguntas o comentarios?</b> 1-866-483-2846	

\*Este producto no es fabricado ni distribuido por Stiefel Laboratories Inc., propietario de la marca comercial Zeasorb



Silka ANTIFUNGAL CREAM

<b>Drug Facts</b>	<b>Información sobre el medicamento</b>		
<b>Active ingredient</b>	<b>Purpose</b>	<b>Principio activo</b>	<b>Propósito</b>
Terbinafine hydrochloride 1%.....Antifungal		Clorhidrato de terbinafina 1%.....Antimicótico	
<b>Uses</b> ■ cures most athlete's foot (tinea pedis) ■ cures most jock itch (tinea cruris) and ringworm (tinea corporis) ■ relieves itching, burning, cracking and scaling which accompany these conditions		<b>Usos</b> ■ cura la mayoría de los casos de pie de atleta (tinea pedis) ■ cura la mayoría de los casos de tiña inguinal (tinea cruris) y tiña corporal (tinea corporis) ■ alivia el prurito, el ardor, el agrietamiento y la descamación que acompañan a estas afecciones	
<b>Warnings</b> <b>For external use only</b>  <b>Do not use</b> ■ on nails or scalp ■ in or near the mouth or the eyes ■ for vaginal yeast infections  <b>When using this product</b> do not get into the eyes. If eye contact occurs, rinse thoroughly with water.  <b>Stop use and ask a doctor if</b> ■ too much irritation occurs or gets worse.  <b>Keep out of reach of children.</b> If swallowed, get medical help or contact a poison control center right away.		<b>Advertencias</b> <b>Únicamente para uso externo</b>  <b>No lo use</b> ■ en las uñas ni en el cuero cabelludo ■ en ni cerca de la boca o los ojos ■ para micosis vaginal  <b>Al usar este producto</b> evite el contacto con los ojos. Si se produce contacto, enjuáguelos de inmediato con abundante agua. <b>Interrumpa el uso y consulte con un médico en caso de</b> ■ excesiva irritación o si empeora.  <b>Mantenga fuera del alcance de los niños.</b> En caso de ingestión, busque asistencia médica o llame a un centro de control de envenenamiento de inmediato.	
<b>Directions</b> ■ adults and children 12 years and older ■ use the tip of the cap to break the seal and open the tube ■ wash the affected skin with soap and water and dry completely before applying. ■ <b>for athlete's foot</b> wear well-fitting, ventilated shoes. Change shoes and socks at least once daily. ■ <b>between the toes only:</b> apply twice a day (morning and night) for <b>1 week</b> or as directed by a doctor. ■ <b>on the bottom or sides of the foot:</b> apply twice a day (morning and night) for <b>2 weeks</b> or as directed by a doctor. ■ <b>for jock itch and ringworm:</b> apply once a day (morning or night) for <b>1 week</b> or as directed by a doctor. ■ wash hands after each use. ■ children under 12 years: ask a doctor.		<b>Instrucciones</b> ■ adultos y niños mayores de 12 años de edad ■ use la punta de la tapa para romper el sello y abrir el tubo ■ lave el área de piel afectada con jabón y agua y seque completamente antes de la aplicación. ■ <b>para el pie de atleta:</b> use zapatos con buen caíce y ventilados. Cambie los zapatos y las medias al menos una vez al día. ■ <b>sólo entre los dedos del pie:</b> aplique dos veces al día (mañana y noche) durante <b>1 semana</b> o según indicación médica. ■ <b>en la planta y en los costados del pie:</b> aplique dos veces al día (mañana y noche) durante <b>2 semanas</b> o según indicación médica. ■ <b>en el caso de tiña inguinal o tiña corporal:</b> aplique una vez al día (mañana o noche) durante <b>1 semana</b> según indicación médica. ■ lávese las manos después de cada uso. ■ niños menores de 12 años: consultar con un médico.	
<b>Other information</b> ■ do not use if seal on tube is broken or is not visible ■ store at controlled room temperature 20° to 25°C (68° to 77°F) ■ see carton or tube crimp for lot number and expiration date		<b>Información adicional</b> ■ no lo use si el sello del tubo está roto o no es visible ■ conserve a temperatura ambiente controlada de 20-25 °C (68-77 °F) ■ vea el envase o el tubo para el número de lote o la fecha de vencimiento	
<b>Inactive ingredients</b> benzyl alcohol, cetyl alcohol, cetyl palmitate, isopropyl myristate, polysorbate 60, purified water, sodium hydroxide, sorbitan monostearate, stearyl alcohol.		<b>Ingredientes inactivos</b> alcohol bencílico, alcohol cetílico, palmitato cetílico, miristato de isopropilo, polisorbato 60, agua purificada, hidróxido de sodio, sorbitano monoestearato, alcohol estearílico.	
<b>Questions?</b> 1 877 99 GENOM (43666) Monday to Friday, 8 am to 6 pm Central time.		<b>¿Preguntas?</b> 1 877 99 GENOM (43666) Lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m. hora del centro.	